No. 38.

## LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

# TAUSCH-CATALOG 1883 No. 1
## der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.
## *Binnen-Conchylien*
## aus dem paläarctischen Faunengebiet.

(Fortsetzung.)

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben.

| | Mk. |
|---|---|
| **Helix** | |
| muralis Müll. | 0,10-20 |
| var. crispata Ben. | 0,20 |
| „ undulata | 0,20 |
| globularis Ziegl. | 0,20-30 |
| var. saracena | 0,30 |
| platychela Mke. | 0,20-40 |
| sicana Fér. | 0,20-40 |
| Paciniana Phil. | 0,20-30 |
| scabriuscula Desh. | 0,20-40 |
| Gualtieriana L. | 0,80-1,50 |
| Niciensis Fér. | 0,20-40 |
| serpentina Fér. | 0,10-20 |
| tetrazona Jan. | 0,30-40 |
| strigata Müll. | 0,20-30 |
| var. surrentina | 0,20 |
| „ var. Moltenii | 0,20-30 |
| carsoliana Fér. | 0,20-30 |
| Nebrodensis Pirajn. | 0,20-40 |
| spiriplana Oliv. | 0,50-80 |
| caesareana Parr. | 0,50-80 |
| ——— | |
| desertorum Forskal | 0,20-30 |
| var. inflata | 0,30 |
| desertella Jick. | 0,50-80 |
| ——— | |
| aspersa Müll. | 0,10 |
| Mazzullii Jan. | 0,20-30 |
| pomatia L. | 0,10-20 |
| var. sinistrorsa | 2—3 |
| lucorum Müll. | 0,40-50 |
| var. straminea | 0,50 |
| radiosa Ziegl. | 0,40-80 |
| secernenda Rossm. | 0,40-50 |
| ligata Müll. | 0,20-30 |
| var. truentina. | 0,30 |
| „ minor | 0,20 |
| cincta Müll. | 0,20-30 |
| var. Pollini da Campo | 0,40 |
| melanostoma Drp. | 0,20-30 |
| lutescens Zgl. | 0,30-40 |
| Godetiana Kob. II. Qual. | 0,50 |
| aperta Born | 0,20-30 |
| ——— | |
| Seetzeni Koch | 0.20-40 |
| var. fasciata | 0,40-50 |
| pisana Müller | 0,10 |
| ——— | |
| variabilis Drap. | 0,10-20 |
| var. virgata Mont. | 0,10 |
| tergestana Stossic | 0,20 |
| luteata Parreyss | 0,30-40 |
| subprofuga Stab. | 0,10-30 |
| turbinata Jan. | 0,20-30 |
| hellenica Bourg. | 0,20-30 |
| variegata Friev. | 0,10-20 |
| maritima Drap. | 0,10-20 |
| submaritima Desm. | 0,20-30 |
| ——— | |
| cretica Fér. | 0,30 |
| var. cauta Westl. | 0,10-20 |
| Adolfi Pfr. | 0,50 |
| stiparum Rossm. | 1-1,20 |
| Arigonis Rossm. | 0,20-40 |
| cespitum Drap. | 0,20-40 |
| neglecta Drap. | 0,20-30 |
| candicans Zgl. | 0,10 |
| Ammonis Ad. Schm. | 0,20-30 |
| ericetorum Müll. | 0,10 |
| homoleuca Sabljar | 0,20 |
| Theodosiae Clessin | 0,30-40 |
| derbentina Andrz. | 0,20-30 |
| instabilis Ziegler | 0,20-30 |
| destituta Charp. | 0,20 |
| bathyomphala Charp. | 0,20 |
| filimargo Kryn. | 0,30 |
| corrugata Gmel. | 0,20-40 |
| explanata Müll. | 0,20 |
| Ledereri Pfr. | 0,20-40 |
| apicina Lam. | 0,10 |
| costulata Ziegl. | 0,10-20 |
| profuga Schmidt | 0,10-20 |
| substriata Clessin | 0,20-40 |
| candidula Studer | 0,10 |
| conspurcata Drap. | 0,10 |
| meda Porro | 0,20-30 |
| pyramidata Drap. | 0,10-20 |
| Thiesseae Mouss. | 0,20-30 |
| tuberculosa Conrad | 0,20-40 |
| trochoides Poiret | 0,10-20 |
| verticillata Parr. | 0,10-20 |
| syrensis Pfr. | 0,20-40 |
| Newka Dohrn | 0,30-40 |
| elegans Gmel. | 0,10 |
| elata Faure | 0,20-30 |
| Sequentiana Ben. | 0,20-30 |

| | Mk. |
|---|---|
| conoidea Drap. | 0,10-20 |
| Pringi Pfr. | 0,20-30 |
| ventricosa Drap. | 0,10-20 |
| acuta Müll. | 0,10 |
| **Buliminus** | |
| detritus Müll. | 0,10 |
| var. radiatus Brug. | 0,10 |
| „ corneus Mich. | 0,30 |
| labiellus v. Mart. | 0,30-40 |
| fasciolatus Oliv. | 0,40-50 |
| Hohenackeri Kryn. | 0,40-60 |
| tauricus Lang | 0,30-50 |
| v. zebriola Cless. | 0,30 |
| bidens Kryn. | 0,20-40 |
| Retowskianus Cless. | 0,30-50 |
| zebra Oliv. | 0,10 |
| var. boeticus | 0,20 |
| Tonrnefortianus Fér. | 0,80-1 |
| gibber Zgl. | 0,40-50 |
| montanus Drp. | 0,10 |
| obscurus Müll. | 0,10 |
| labrosus Oliv. | 1 |
| var. diminutus Mss. | 0,60 |
| sidoniensis Charp. | 0,50-80 |
| — | |
| attenuatus Mouss. | 0,60-1 |
| pupa Brug. | 0,20 |
| pusio Brod. | 0,30-40 |
| venerabilis Parr. | 0,30-40 |
| — | |
| tridens Müll. | 0,10-20 |
| var. eximia | 0,20 |
| „ Bayeri Parr. | 0,30-40 |
| Bergeri Roth | 0,20-30 |
| niso Risso | 0,20-30 |
| quadridens Müll. | 0,10-20 |
| Thiesseanus Mouss. | 0,20 |
| var. minor Blanc | 0,20 |
| Saulcyi Bourg. | 0,30-40 |
| ovularis Oliv. | 0,20-30 |
| septemdentatus Roth | 0-20-30 |
| var. elongatus Roth | 0,40 |
| chondriformis Mouss. | 0,30 |
| obtusa Drp. | 0,40-50 |
| **Cionella** | |
| lubrica Müller | 0,10 |
| maderensis Lowe | 0,20 |
| tridens Pult. | 0,20-30 |
| var. Nouletiana Dup. | 0,30 |
| pupaeformis Cantr. | 0,30 |
| folliculus Gronov. | 0,10 |

| | Mk. |
|---|---|
| Vescoi Bourg. | 0,10-20 |
| melampoides Lowe | 0,30-40 |
| oryza Lowe | 0,20 |
| vitrea Webb | 0,20 |
| tornatellina Lowe | 0,20 |
| Hierosolymarum Roth | 0,20-30 |
| acicula Müll. | 0,10 |
| **Stenogyra** | |
| decollata Linné | 0,10-20 |
| **Pupa** | |
| pallida var. amycta Parr. | 0,10-20 |
| cinerea Drap. | 0,10-20 |
| frumentum Drap. | 0,10 |
| var. pachygastris Zgl. | 0,20 |
| „ apennina Charp. | 0,10-20 |
| „ elongata Rossm. | 0,10-20 |
| variabilis Drap. | 0,10-20 |
| affinis Rossm. | 0,30-40 |
| pyrenaearia Boub. | 0,20-30 |
| megachilos Jan. | 0,10-20 |
| var. bigorriensis | 0,20 |
| avenacea Brug. | 0,10 |
| bergamensis Charp. | 0,10-20 |
| Kobelti Hid. | 0,30-40 |
| Farinesii Desm. | 0,20 |
| calpica Westerl. | 0,30 |
| Mühlfeldtii Kstr. | 0,10 |
| rhodia Roth | 0,10-20 |
| Philippii Cantr. | 0,10 |
| dolium Mich. | 0,10-20 |
| doliolum Brug. | 0,10 |
| var. scypus Friv. | 0,10 |
| Schmidti Kstr. | 0,40 |
| Kokeili Rossm. | 0,20-30 |
| truncatella Zgl. | 0,20-30 |
| biplicata Mich. | 0,20-30 |
| var. excessiva Gredler | 0,30 |
| Ferrarii Porro | 0,10-20 |
| pagodula Desm. | 0,20 |
| muscorum Linné | 0,10 |
| triplicata Studer | 0,20 |
| edentula Drap. | 0,10-20 |
| minutissima Hartm. | 0,10-20 |
| costulata Nilss. | 0,10-20 |
| antivertigo Drap. | 0,10 |
| Lilljeborgi Westerl. | 0,20-30 |
| pygmaea Drap. | 0,10 |
| pusilla Müll. | 0,10-20 |
| angustior Jeffr. | 0,10 |
| **Balea** | |
| fragilis Drap. | 0,10-20 |

Bei **sofortiger** Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. A. **Müller** zu adressiren.

Briefe einfach an die **„LINNÆA“, Naturhist. Institut**
**Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.**

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

## No. 39.

# LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

## TAUSCH-CATALOG 1883 No. 2
## der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

| | | Mk. |
|---|---|---|
| **Oliva.** | | |
| Araneosa Lam. | Calif. | 0,30-60 |
| carneola Gmel. | Philipp. | 0,20-30 |
| Cumingi Reeve | Panama | 1-1,20 |
| dama Mawae | Calif. | 0,20-50 |
| erythrostoma Lam. | Oc. ind. | 0,30-1 |
| episcopalis „ | Maur. | 0,30-50 |
| elegans „ | Philipp. | 0,30-50 |
| flammulata „ | Sénégal | 0,20-60 |
| fusiformis „ | Oc. ind. | 0,50-1 |
| graphica Marat | Real Llejos | 0,30-50 |
| guttata Lam. | Philipp. | 0,30-60 |
| inflata Lam. | Sansibar | 0,20-30 |
| ispidula L. | Philipp. | 0,10-30 |
| ligneola Reeve | Macacaibo | 0,80-1 |
| litterata Lam. | Ind. occ. | 0,20-50 |
| Keeni Mar. | Viti Ins. | 0,60-80 |
| maura Lam. | Philipp. | 0,50-1 |
| panniculata Ducl. | Ind. occ. | 0,20-30 |
| ponderosa Ducl. | Maur. | 0,40-50 |
| peruviana Lam. | Peru | 0,50-1 |
| porphyrea „ | Panama | 1—4 |
| reticularis „ | Ind. occ. | 0,30-60 |
| sanguinolenta „ | Molukk. | 0,20-40 |
| scripta „ | Aust. | 0,40-80 |
| tesselata „ | Philipp. | 0,20-40 |
| tremulina „ | „ | 0,40-1 |
| var. = nobilis Reeve | „ | 0,60-1,50 |
| tricolor Lam. | Maur. | 0,20-40 |
| **Olivancillaria** | | |
| brasiliensis Chem. | Bras. | 0,50-1,20 |
| gibbosa Born | Oc. ind. | 0,30-80 |
| nebulosa Lam. | Salanga | 0,50-80 |
| **Aragonia** | | |
| Steeriae Reeve | Gambia | 0,40-60 |
| **Olivella** | | |
| nivea Gmel. | Ind. occ. | 0,10-20 |
| var. monilifera Reeve | „ | 0,10-30 |
| „ oryza Lam. | „ | 0,10 |
| jaspidea Gmel. | „ | 0,20-30 |
| mutica Say | S. Carolina | 0,10-20 |
| rosalina Duclos. | Jamaica | 0,20-30 |
| rufifasciata Reeve | „ | 0,30-40 |
| tergina Duclos. | Panama | 0,30-40 |
| volutella Lam. | „ | 0,10-20 |
| undatella „ | Acapulco | 0,10-30 |

| | | Mk. |
|---|---|---|
| **Callianax** | | |
| biplicata Sow. | Calif. | 0,20-50 |
| columellaris Sow. | Peru | 0,10-20 |
| semistriata Gray | Columb. | 0,10-20 |
| **Dipsacus** | | |
| glabratus L. | Ceylon | 0,40-1 |
| **Fasciolaria** | | |
| filamentosa Lam. | Philipp. | 1-1,50 |
| var. inermis Jon. | m. rubr. | 1 |
| salmo Brod. | Panama | 1—2 |
| trapezium L. | „ | 0,50-1 |
| tulipa L. | Ind. occ. | 0,50-1,50 |
| **Tudicla** | | |
| spirillus L. | Singapore. | 1—2 |
| **Turbinella** | | |
| armata Brod. | Elisabeth-I. | 1-2,50 |
| ceramica L. | Philipp. | 2—3 |
| cornigera Lam. | „ | 0,50-1 |
| rhinoceros Chem. | Sansibar | 0,60-1,50 |
| **Leucozonia** | | |
| brasilia d'Orb. | Bras. | 1—2 |
| cingulata Lam. | Panama | 1-1,50 |
| nassa Gmel. | Ind. occid. | 1—2 |
| rudis Reeve | | 2 |
| **Plicatella** | | |
| brevicaudata Reeve | Ind. occ. | 2—3 |
| candelabrum „ | „ | 1—2 |
| castanea Reeve | Panama | 3.50 |
| craticulata Gmel. | Austr. | 0,50-1,20 |
| Carottiana Tapp. | Maur. | 0,80-1,50 |
| gibbula Gmel. | Austr. | 1—2 |
| infuudibulum Gmel. | Ind. occ. | 1—2 |
| Kobe ti Tapp. | Maur. | 0.60-1 |
| lancea Gmel. | Ticao | 4—5 |
| maculata Reeve | Philipp. | 0,50-1,50 |
| nodata Mart. | Austr. | 1-2,50 |
| polygona Gmel. | Philipp. | 1-1,50 |
| prismatica Reeve | Freundsch. | 5 |
| turrita Gmel. | Philipp. | 0,50-1 |
| Wagneri Anton | „ | 0,60-80 |
| **Peristernia** | | |
| Forskali Tapp. | m. rubr. | 0,40-60 |
| nassatula Lam. | Oc. ind. | 0,50-80 |
| spinosa Mart. | Freundsch.-I. | 0,80-1,20 |
| **Voluta** | | |
| angulata Sow. | Patagonien | 3—6 |
| fusiformis „ | Austr. | 4—6 |
| Ellioti „ | „ | 3—4 |

| | | Mk. |
|---|---|---|
| mitraeformis Lam. | Austr. | 5—6 |
| marmorata Swains. | „ | 12—18 |
| Norrisi Sow. | „ | 2—3 |
| pacifica Sow. | N. Seel. | 4—5 |
| Scapha Chem. | Philipp. | 1-2,50 |
| vexillum L. | Ceylon | 3—4 |
| vespertilio L. | „ | 0,50-1 |
| **Lyria** | | |
| deliciosa Bern. | N.-Caled. | 6—9 |
| **Mitra** | | |
| adusta Lam. | Philipp. | 1—2 |
| ambigua Swains. | „ | 1-1,50 |
| angulosa Kiener | Maur. | 1-1,20 |
| annulata „ | Ceylon | 0,80-1 |
| aureolata Reeve | Maur. | 0,60-80 |
| brumalis „ | „ | 0,60-1 |
| cadaverosa „ | „ | 0,40-60 |
| cardinalis Lam. | Philipp. | 2 |
| casta Sol. | Maur. | 2,50 |
| circulata Kien. | Ceylon | 1-1,20 |
| caffra Lam. | „ | 2 |
| cinerea Reeve | Maur. | 0,40-50 |
| clathrata „ | „ | 0,80-1 |
| crocata Lam. | „ | 1-1,20 |
| crenulata „ | Philipp. | 0,80 1,20 |
| Cumingi Reeve | Maur. | 1-1,50 |
| cucumerina Lam. | „ | 0,60-80 |
| costellaris Lam. | Molukken | 0,80-1 |
| corrugata „ | Philipp. | 0,60-1,20 |
| dactylus „ | „ | 2 |
| exasperata Chem. | Viti-I. | 0,50-60 |
| episcopalis L. | Oc. ind. | 1-1,50 |
| ferruginea Lam. | Maur. | 0,50-1,20 |
| filaris L. | „ | 0,50-1 |
| fissurata Lam. | „ | 2 |
| filum Wood | „ | 0,50-1 |
| fulva Sow. | „ | 0,80-1,20 |
| harpaeformis Reeve | Dahlak-I. | 0,30-50 |
| impressa Ant. | Maur. | 0,60-1 |
| lutea Quoy | „ | 0,50-80 |
| muriculata Lam. | „ | 0,60-1 |
| nodosa Reeve | „ | 0,60-80 |
| nucea Gronov. | „ | 1-1,50 |
| obeliscus Reeve | „ | 1 |
| olivacea Reeve | Maur. | 0,60-1 |
| olivaeformis Sw. | N.-Caled. | 0,80-1 |
| pacifica Reeve | Hoods-Is. | 0,50-60 |
| Rüppelli Reeve | Massaua | 0,50-80 |
| scabriuscula Lam. | Maur. | 0,80-1,20 |
| spadicea Dunker | Samoa-I. | 0,50 |
| speciosa Reeve | Maur. | 1 |
| sphaerulata Mart. | Philipp. | 1—2 |
| stigmataria Lam. | Maur. | 3 |
| ticaonica Reeve | Philipp. | 0,50-1 |
| tabanula „ | Maur. | 0,50-60 |
| thiarella Sow. | „ | 0,60-80 |
| tigrina A. Ad. | „ | 0,60-1 |
| tuberosa Reeve | „ | 0,60-80 |
| turgida „ | Samoa-I. | 0,50-60 |
| turben „ | Philipp. | 1,50 |
| venustula „ | Maur. | 0,40-60 |
| variegata „ | „ | 0,80-1,20 |
| vulpecula Lam. | Philipp. | 0,60-1,20 |
| **Conchelix** | | |
| marmorata Swains. | Pelew-I. | 0,30-40 |
| **Marginella** | | |
| advena Kien. | St. Thomas | 0,20 30 |
| amygdala Lam. | Goree | 0,50-60 |
| cincta Kiener | „ | 2 |
| cingulata Dillw. | „ | 0,10-30 |
| Cleryi Petit | „ | 2 |
| conoidalis Lam. | Cuba | 0,20-30 |
| curta Sow. | Peru | 1-1,20 |
| diaphana Kien. | Ind. occ. | 0,20-30 |
| glabella L. | Gorée | 1—2 |
| Goodalli Sow. | „ | 12—20 |
| guttata Dillw. | Jamaica | 0,20-30 |
| lactea Kien. | St. Thomas | 0,20-30 |
| laeta Jouss. | Gorée | 1-1,50 |
| interrupta Lam. | Porto Cabello | 0,10-20 |
| monile Lam. | Gorée | 0,20 |
| pallida L. | St. Jan | 0,30-50 |
| philippinarum Reeve | Zebu | 0,30-40 |
| olivaeformis Kien. | Gorée | 1—2 |
| persicula Lam. | „ | 0,30-50 |
| pseudofaba Sow. | „ | 12—16 |
| prunum Gmel. | Ind. occ. | 0,30-60 |
| quinqueplicata L. | Molukk. | 0,50-1 |
| varia Sow. | Calif. | 0,20-30 |

Bei **sofortiger** Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren.

Briefe einfach an die „LINNÆA", Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

No. 41.

# LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

## TAUSCH-CATALOG 1883 No. 3
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

## *Binnen-Conchylien*
## aus dem präarctischen Faunengebiet.

(Fortsetzung.)

Die genaueren Fundorte werden auf den Etiquetten angegeben

### *Clausilia.*

| | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|
| agnata Partsch | 0,10 | var. triplicata Stud. | 0,20 |
| Adelinae Ben. | 0,20-30 | costulata Jan. | 0,20-30 |
| armata Kutschig | 0,20 40 | cana Held | 0,10-20 |
| almissana Küst. | 0,20 | clandestina Rossm. | 0,30 |
| albocincta Pfr. | 0,20 | f. minor | 0,30 |
| aquila Parr. | 0,30 | coarctata Mouss. | 0,20-30 |
| Agesilaos v. Mart. | 0,30 | corynodes Held | 0,10-20 |
| archilabris Kutsch | 0,20 | cincta Rossm. | 0,10-20 |
| var. Rosinae Klec. | 0,30-40 | var. Rossmaessleri Pfr. | 0,10-20 |
| affinis Phil. | 0,20 | Stenzi Parr. | 0,10-20 |
| Alschingeri Küst. | 0,30-40 | concilians A. Schmidt | 0,10-20 |
| angustata Bielz | 0,30 | commutata Rossm. | 0,10-20 |
| asphaltina Zgl. | 0,20 | var. granatina | 0,10-20 |
| attica Parr. | 0,20-30 | var. fusca de Belta | 0,10-20 |
| bidens L. | 0,10 | var. ungulata Zgl. | 0,10-20 |
| bidentata Ström. | 0,10 | canescens Parr. | 0,10-20 |
| var. septentrionalis | 0,10 | crassilabris Küst. | |
| biplicata Mtg. | 0,10 | var. pharensis Klec. | 0,30-40 |
| subsp. bohemica Cl. | 0,20-30 | „ fasciolata Parr. | 0,20-30 |
| blanda Zgl. typus | 0,40 50 | dacica Friv. | 0,30 |
| bilabiata Wagn. | 0,20-30 | dubia Drap. | 0,10 |
| Blanci v. Mart. | 0,20 | var. transylvanicaA.Schm. | 0,20 |
| Bergeri Mayer | 0,10-20 | densestriata Zgl. | 0,10-20 |
| binodata Zgl. | 0,20 | deltostoma Lowe | 0,20 |
| Boissieri Charp. | 0,20-30 | var. undulata Parr. | 0,20 |
| Bielzi Pfr. | 0,20 | dalmatina Partsch | 0,20 |
| bicristata Friv. | 0,20 | var. minor | 0,20 |
| var. tetragonostoma Pfr. | 0,20-30 | discolor Pfr. | 0,30 |
| „ canaliculata | 0,20 | var. flamulata Pfr. | 0,20-30 |
| Balsamoi Strobel | 0,20-30 | divergens Klec. | 0,30-40 |
| bilabiata Wagn. | 0,20-30 | Duboisi Charp. | 0,20-30 |
| cattaroensis Zgl. | 0,10-20 | decipiens Rossm. | 0,20-30 |
| conspurcata Jan. | 0,10 | exarata Zgl. | 0,10-20 |
| caerulea Fér. typus | 0,10-20 | elata Zgl. | 0,20 |
| subg. amorgis Bttg. | 0,10-20 | elegans Bielz | 0,20 |
| f. tinorensis Mouss. | 0,10-20 | var. cerasina Bielz | 0,20-30 |
| var. birugosa Parr. | 0,10-20 | fimbriata Mühlf. | 0,10-20 |
| f. antiparia Bttg. | 0,10-20 | var. pallida Jan. | 0,10-20 |
| f. naxia Bttg. | 0,10-20 | „ suturata Zgl. | 0,10-20 |
| f. nia Bttg. | 0,10-20 | Fusiana Bielz | 0,20 |
| candidescens Zgl. | 0,10 | filograna Zgl. | 0,10-20 |
| var. cinerea Phil. | 0,10-20 | fallax Rossm. | 0,20 |
| Conemenosi Bttg. | 0,30-40 | grayana Pfr. | 0,30 |
| chia Bttg. var. samia Bttg. | 0,20-30 | gibbula Zgl. | 0,10 |
| callifera Küst. | 0,20-30 | subsp. peucetana Kobelt | 0,20 |
| Calcarae Phil. | 1 | Grohmanniana Partsch | 0,20-30 |
| comensis Shuttl. | 0,20-30 | glauca Bielz | 0,20 |
| cruciata Stud. | 0,10 | grisea Desh. | 0,10-20 |

| | Mk. | | Mk. |
|---|---|---|---|
| gastrolepta Zgl. | 0,20 | var. cornea Zgl. | 0,10 |
| grossa Zgl. | 0,20-30 | plicata Drap. | 0,10 |
| Haueri Bielz | 0,30-40 | parvula Stud. | 0,10 |
| Helenae Klec. | 0,40-50 | punctulata Küst. | 0,10 |
| isabellina Pfr. | 0,20 | piceata Zgl. | 0,20 |
| itylensis Bttg. | 0,50-60 | var. gracilior | 0,20 |
| interrupta Zgl. | 0,10-20 | Pikermiana Roth | 0,20 |
| itala v. Mart. | 0,10-20 | Pfeifferi Küst. | 0,20 |
| var. punctulata Mich. | 0,10-20 | pachygastris Zgl. | 0,20 |
| var. ornata | 0,10-20 | var. bulla Parr. | 0,20 |
| var. nigra | 0,10-20 | pachystoma Küst. | 0,20 |
| incommoda Bttg. | 0,20-30 | profuga Charp. | 0,30-40 |
| incisa Küst. | 0,20 | pachychila Zgl. | 0,20 |
| Josephinae Bttg. | 0,30-50 | pumila Zgl. | 0,10-20 |
| Kutschigi Küst. | 0,30-40 | Pauli Mabille | 0,30-40 |
| var. contracta | 0,30 | plicata Drap. | 0,10 |
| Kephissiae Roth | 0,20-30 | var. sine plicis | 0,10-20 |
| var. holostoma Bttg. | 0,30-40 | plicatula Drap. | 0,10 |
| laminata Mtg. | 0,10 | pagana Zgl. | 0,20-30 |
| leucostigma Zgl. | 0,10 | regalis Parr. | 0,20 |
| var. candidilabris Porro | 0,10 | regularis Parr. | 0,30-40 |
| „ opalina | 0,20 | rugosa Drap. | 0,10-20 |
| lunellaris Pfr. | 0,20 | var monziana Lowe | 0,20-30 |
| livida Menke | 0,20 | „ Reboudi Dup. | 0,20 |
| var. minor A. Schm. | 0,20 | Rothi Zel. v. eustrophe Bttg. | 0,40-50 |
| Lischkeana Parr. | 0,10-20 | Rosinae Klec. | 0,50-60 |
| var. cornea A. Schm. | 0,10-20 | rugicollis Zgl. | 0,20-30 |
| leucoraphe Blanc | 0,30-40 | robusta Küst. | 0,30 |
| laevissima Zgl. | 0,10-20 | straminicollis Parr. | 0,10-20 |
| f. superstructa Partsch | 0,20 | sericata Pfr. | |
| Lowei Albers | 0,60-80 | var. bifilosa Blanc | 0,30 |
| lineolata Held | 0,10 | sulcosa Wagner | 0,20 |
| lamellosa Wagn. | 0,20 | strigillata Mühlf. | 0,20 |
| maesta Fér. | 0,20-30 | syracusana Phil. | 0,20-30 |
| maculosa Desh. | 0,20-30 | septemplicata Phil. | 0,20-30 |
| messenica v. Mart. | 0,20 | solida Drap. | 0,10-20 |
| marginata Ziegl. | 0,20 | stigmatica Zgl. | 0,20-30 |
| montana Sten. | 0,20-30 | semilabiata Kutsch | 0,20-30 |
| mucida Ziegl. | 0,10-20 | semirugata Ziegl. | 0,20 |
| v. badia Zgl. | 0,10-20 | var. narentana K. | 0,20-30 |
| maritima Klec. | 0,30-40 | succineata Zgl. | 0,10-20 |
| Menelaos v. Mart. | 0,20-30 | stabilis Ziegl. | 0,20-30 |
| macarana Zgl. | 0,20-30 | sejuncta A. Schmidt | 0,20 |
| naevosa Fér. | | turrita Pfr. | 0,20 |
| var. senilis Rossm. | 0,20-30 | virgata Jan. sp. | 0,20 |
| „ modesta Zgl. | 0,20 | ventricosa Drap. | 0,10-20 |
| negropontina Pfr. | | varians Zgl. | 0,10-20 |
| var. costulata Thiesse | 0,20-30 | var. diaphana Zgl. | 0,10-20 |
| osculans v. Mart. | 0,20-30 | vallata Mouss. | 0,30-50 |
| orthostoma Mk. | 0,10 | vetusta Ziegl. | 0,20 |
| f. filiformis A. Schm. | 0,10-20 | var. festiva Küst. | 0,10-20 |
| ornata Zgl. | 0,10-20 | var. striolata Parr. | 0,20-30 |
| plumbea Rossm. | 0,10-20 | vibex Rossm. | 0,20 |

Bei **sofortiger** Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. A. **Müller** zu adressiren.

Briefe einfach an die **„LINNÆA“, Naturhist. Institut**
**Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.**

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

# Preisverzeichniss IV
# verkäuflicher Mollusken d. Kaukasusländer

aus Hrn. H. Leder's Ausbeute 1882.

Alle angebotenen Stücke sind untadelhaft in Form und Farbe; † bedeutet nicht ganz tadellos. Preise in Reichsmark und Pfennigen; Emballage zum Selbstkostenpreis; Porto wird extra berechnet.

*1 Mark = 1 Schilling = 1,20 Francs.*

| | Exemplare | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Trigonochlamys imitatrix Bttg. in Spiritus 7,50 bis | 10 | — | — | — |
| Daudebardia Lederi Bttg. in Spir. od. Schale 5,00 bis | 7,50 | — | — | — |
| „ Heydeni Bttg. desgl. | 5,00 | — | — | — |
| Glandina Algira var. Mingrelica Bttg. | 1,50 | 2 80 | — | — |
| Limax ecarinatus Bttg. in Spiritus | 4,00 | — | — | — |
| „ variegatus Drap. desgl. | 0,60 | 1,10 | — | — |
| „ agrestis L. var. desgl. | 0,50 | 0,90 | — | — |
| „ melanocephalus Kal. desgl. | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,60 |
| „ intermittens Bttg. desgl. | 3,00 | — | — | — |
| Amalia Lederi Bttg. desgl. 5,00 bis | 7,50 | — | — | — |
| „ Brandti v. Mart. desgl. 5,00 bis | 7,50 | — | — | — |
| Parmacella Olivieri Cuv. desgl. | 1,00 | 1,75 | 3,00 | 4,00 |
| „ „ Schale allein | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| †Vitrina annularis Stud. todt gesammelt | 0,40 | 0,75 | — | — |
| „ (Trochovitrina) Lederi Bttg. in Spiritus | 1,00 | 1,80 | — | — |
| † „ „ „ todte Schale | 0,60 | 1,10 | — | — |
| † „ „ subcarinata Bttg. (jung) | 1,00 | 1,80 | — | — |
| Hyalinia fulva Müll. | — | 0,20 | — | 0,40 |
| † „ (Conulopolita) Raddei Bttg. todt gesammelt | 4,00 | — | — | — |
| † „ suturalis Bttg. Mundsaum verletzt | 0,75 | 1,40 | — | — |
| „ cellaria var. Sieversi Bttg. | 0,50 | 0,90 | 1,50 | 2,00 |
| † „ pura Ald. | — | 0,25 | — | 0,50 |
| „ contortula Kryn. | 0,40 | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| „ angystropha Bttg. | 1,75 | 3,00 | — | — |
| „ nitida Müll. | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 0.80 |
| † „ (Retinella) Mingrelica Mouss. typ. | 3.00 | — | — | — |
| „ „ „ var. intermissa Kob. | 2,00 | 3,80 | — | — |
| „ „ Kutaisiana Mouss. typ. | 0,75 | 1,35 | 2,25 | 3,00 |
| „ „ „ var. transitans Bttg. | 1,00 | 1.90 | — | — |
| „ „ filicum Kryn. | 0,80 | 1,40 | 2,40 | 3,60 |
| „ „ Duboisi Charp. | 2,00 | 3,80 | — | — |
| „ „ elegans Bttg. | 1,50 | 2,75 | 4,50 | — |
| † „ „ Suanetica Bttg. | 2,50 | — | — | — |

| | Exemplare | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Patula rupestris Drap. | — | 0,20 | — | 0,40 |
| „ pygmaea Drap. | — | — | — | 0,20 |
| „ Lederi Bttg. | 1,50 | 2,75 | — | — |
| „ ruderata Stud. | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| Helix aculeata Drap. | — | — | — | 0,20 |
| „ pulchella Müll. | — | 0,20 | — | 0,35 |
| „ costata Müll. | — | — | — | 0.20 |
| „ globula Kryn. typ. und f. nana Bttg. | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| „ Talyschana v. Mts. | 6,00 | — | — | — |
| „ flaveola Kryn. typ | 1.75 | 3,00 | — | — |
| „ „ f. pallida Bttg. | 1,50 | 2,75 | 4,50 | — |
| „ „ f. castanea Bttg. | 2,50 | — | — | — |
| „ Circassica Charp. | 1,00 | 1,75 | 3,00 | 4,00 |
| „ frequens Mouss. typ. | 0,30 | 0,55 | 0,90 | 1,20 |
| „ (Nummulina) Prometheus Bttg. | 2,00 | 3,80 | — | — |
| „ Ravergieri Kryn. typ. | 1,75 | 3,25 | — | — |
| † „ „ var. Transcaucasia Mouss. | 1,00 | 1,80 | — | — |
| „ Narzanensis Kryn. typ. | 0,30 | 0,55 | 0,90 | 1,20 |
| „ „ var. cyclothyra Bttg. | 0,80 | 1,50 | — | — |
| † „ „ var. Suanetica Bttg. | 1,00 | 1,80 | — | — |
| † „ „ var. olivacea Bttg. | 0,40 | 0,75 | — | — |
| „ „ var. Appeliusi Mouss. (abgerieben) | 0,75 | 1,45 | — | — |
| „ (Fruticocampylaea) flavolimbata Bttg. 3,00 bis | 5,00 | — | — | — |
| „ pratensis Pfr. | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| „ „ f major m. | 0,70 | 1,30 | — | — |
| „ (Fruticocampylaea) Pontica Bttg. u. var. | 1,50 | 2,90 | 5,40 | — |
| „ Derbentina Andrz. u. var. | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 0,80 |
| „ Krynickii Andrz. u. var. | 0,25 | 0,45 | 0,75 | 1,10 |
| † „ crenimargo Kryn., meist todt gesammelt | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| „ atrolabiata Kryn. var. subnemoralis v. Mts. | 0,80 | 1,40 | 2,40 | 3,60 |
| „ „ „ „ f. tricolor Bttg. | 1,50 | — | — | — |
| „ „ „ „ f. maculato-fasciata Bttg. | 1,00 | — | — | — |
| „ „ „ „ f. decussata Bttg. | 1,25 | — | — | — |
| „ „ var. Pallasi Dub. | 2,00 | — | — | — |
| „ „ var. Stauropolitana A. Schm. | 1,00 | 1,80 | — | — |
| „ „ var. Lencoranea Mouss. | 0,50 | 0,90 | 1,50 | 2,00 |
| „ „ „ „ f. unicolor Bttg. | 2,00 | — | — | — |
| „ Buchi Dub. f. minor Bttg | 1,75 | 3,25 | — | — |
| Buliminus Hohenackeri Kryn. | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 |
| „ (Retowskia) Schlaeflii Mouss. todt ges. | 10 | — | — | — |
| „ (Ena) Boettgeri Cless. (tener ol.) | 1,50 | 2,75 | — | — |
| „ „ Caucasius Pfr., todt ges. 2,00 bis | 3,00 | — | — | — |
| „ (Chondrula) Lederi Bttg. | 1,25 | 2,25 | — | — |
| „ tridens Müll. und f. marcida m. | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 |
| „ „ var. eximia Rssm. | 0,40 | 0.75 | 1,20 | 1,60 |
| „ „ var. Kubanensis Mouss. | 0,50 | 0,90 | — | — |
| „ didymodus Bttg. | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| „ lamelliferus Rssm. var. Phasianus Dub. | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 |

| | Exemplare | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Cochlicopa lubrica Müll. typ. | — | 0,20 | 0,35 | — |
| „ „ var. minima Siem. | — | — | 0,20 | — |
| „ „ var. columna Cless. | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0,80 |
| Pupa granum Drap. | — | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
| „ avenacea Brug. | — | — | 0,20 | 0,30 |
| „ muscorum var. Caucasia Bttg. | — | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| „ triplicata Stud. und var. | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0,80 |
| „ interrupta Reinh. | 0,40 | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| „ cylindracea Da Costa | — | — | — | 0,20 |
| „ Semproni Charp. typ. | 0,50 | — | — | — |
| „ „ var. Caspia Pfr. | 0,50 | 0,90 | 1,50 | — |
| „ superstructa Mouss. typ. | 0,30 | 0,55 | 0,90 | 1,20 |
| „ „ var. zonata Bttg. | 0,50 | 0,90 | — | — |
| „ doliolum Brug. | — | — | — | 0,20 |
| „ Raymondi Bgt. | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| „ claustralis Gredl. var. clavella Reinh. | 0,40 | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| „ Strobeli Gredl. | 0,60 | — | — | — |
| „ costulata Nilss. | — | — | — | 0,20 |
| „ minutissima Hartm., todt gesammelt | 0,20 | — | — | — |
| „ pagodula Desm. var. Lederi Bttg., desgl. | 0,50 | 0,90 | 1,50 | — |
| „ antivertigo Drap. | — | — | — | 0,20 |
| „ pygmaea Drap. | 0,20 | — | — | — |
| „ Sieversi Bttg. typ. | 1,00 | 1,80 | 3,00 | — |
| „ pusilla Müll. | 0,20 | 0,40 | — | — |
| „ angustior Jeffr. | 0,30 | — | — | — |
| Clausilia perlucens Bttg., todt gesammelt | 3,00 | — | — | — |
| „ (Acrotoma) semicincta Bttg. | 2,00 | 3,80 | — | — |
| „ serrulata Pfr. | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| „ Sieversi Mouss. | 0,75 | 1,25 | 2,25 | 3,00 |
| „ semilamellata Mouss. | 0,50 | 0,90 | 1,50 | 2,00 |
| „ Lederi Bttg. typ. | 4,00 | — | — | — |
| † „ „ var. gradata Bttg. | 2,00 | — | — | — |
| „ litotes A. Schm. typ. | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| „ „ var. Suanetica Bttg. | 0.40 | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| „ Duboisi Charp. u. f. minor Ad. Schm. | 0,20 | 0,30 | 0,55 | 0,70 |
| „ Strauchi Bttg. | 1,00 | 1,80 | 3,00 | — |
| „ pleuroptychia Bttg. var. polygyra Bttg. | 0,80 | 1,50 | 2,40 | 3,20 |
| „ dipolauchen Bttg. | 0,90 | 1,70 | 2,70 | 3,60 |
| † „ pumiliformis Bttg., schwach verletzt | 5,00 | — | — | — |
| „ quadriplicata A. Schm., abgerieben | 0,80 | 1,50 | 2,40 | — |
| „ derasa Mouss. typ. | 1,00 | 1,80 | 3,00 | — |
| „ „ var. Ossetica A. Schm. | 1,00 | 1,80 | 3,00 | — |
| „ Tschetschenica Bay. | 0,40 | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| „ foveicollis Charp. | 0,20 | 0,35 | 0.60 | 0,80 |
| † „ Gustavi Bttg. 2,00 bis | 4,00 | — | — | — |
| „ (Micropontica) closta Bttg. nach Güte 3,00 bis | 5,00 | — | — | — |
| Succinea putris L. var., sehr kleine Form | 0,30 | 0,55 | — | — |
| „ Pfeifferi Rssm., kleine Form | 0,30 | 0,55 | — | — |
| Carychium minimum Müll. var. | — | — | — | 0,20 |

| | Exemplare | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Carychium Lederi Bttg. | 0,50 | 0,90 | 1,50 | — |
| Acme Moussoni Bttg. | 4,00 | — | — | — |
| Pomatias Lederi Bttg. | 1,00 | 1,90 | — | — |
| Cyclostoma costulatum Rssm. | 0,20 | 0,30 | 0,55 | 0,70 |
| „ „ var. Hyrcana v. Mts. | 0,30 | 0,55 | 0,90 | 1,20 |
| Cyclotus Sieversi Pfr. | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| Melanopsis praerosa var. Mingrelica Mouss. | 0,50 | 0.90 | 1,50 | — |
| †Neritina liturata Eichw. | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0,80 |
| „ fluviatilis var. thermalis Boub.. | — | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
| Limneus tener Parr., todt gesammelt | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0.80 |
| „ truncatulus Müll., desgl. | 0,20 | 0,35 | — | — |
| „ pereger Drap. | 0,20 | 0.35 | — | — |
| „ lagotis Schrank, todt gesammelt | 0.40 | 0,70 | 1,20 | 1,60 |
| „ stagnalis var. turgida Mke., desgl. | 0,50 | 0,90 | 1,50 | 2,00 |
| „ „ var. lacustris Stud. | 0,60 | 1,10 | 1.80 | 2,40 |
| Planorbis umbilicatus var. subangulata Phil. | 0,20 | 0,35 | 0.60 | 0,80 |
| „ glaber Jeffr., todt gesammelt | 0,20 | 0,35 | 0,60 | 0,80 |
| Corbicula fluminalis var. fluviatilis Cless. | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 2,40 |
| „ „ var. crassula Mouss. | 0,80 | 1,50 | — | — |
| Pisidium fossarinum Cless. var. | — | 0,20 | 0,40 | 0.50 |
| „ obtusale C. Pfr. | 0,40 | 0,70 | — | — |
| Unio Batavus var. Mingrelica Drouët | 0,60 | 1,10 | — | — |
| Anodonta anatina L. var. | 0,40 | 0,75 | — | — |
| „ piscinalis Nilss. var. cyrea Drouët | 3,00 | 5,50 | — | — |

Adresse für Bestellungen: Hrn. Dr. O. Boettger,
Seilerstrasse 6, Frankfurt am Main.

---

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt am Main.

No. 45.

# LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

## TAUSCH-CATALOG 1883 No. 4
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

| | | Mk. |
|---|---|---|
| ***Columbella.*** | | |
| bicolor. Kiener | Panama | 0,30-40 |
| cribaria Lam. | Cuba | 0,10-20 |
| Duclosiana Sow. | Molucc. | 0,20-30 |
| fulgurans Lam. | Oc. ind. | 0,10-20 |
| var. punctata | „ „ | 0,10-20 |
| laevigata L. | Cuba | 0,10-20 |
| ligula Ducl. | I. Ticao | 0,40-50 |
| lyrata Sow. | Panama | 0,30-40 |
| major „ | Amer. c. | 0,50-60 |
| mendicaria | M. ind. | 0,20-30 |
| mercatoria L. | W. Ind. | 0,10 |
| nitida Lam. | „ | 0,10-20 |
| pellucida Rv. | I. Viti | 0,20-30 |
| pardalina Lm. | I. Guimar | 0,20-30 |
| rustica L. | M. med. | 0,10-20 |
| subulata Ads. | W. Ind. | 0,20-30 |
| turturina Lm. | Maur. | 0,20-40 |
| valga Gould. | I. Tolau | 0,40-50 |
| ***Harpa.*** | | |
| articularis Lam. | Philippn. | 0,50-1,50 |
| conoidalis Lm. | Maur. | 2—3 |
| costata L. | Maurit. | 10 |
| gracilis Brod. et Sow. | Phil. | 1 |
| minor Rumph | M. ind. | 0,20-80 |
| var. crassa Phil. | Philipp. | 0,20 |
| nobilis Rumph | I. Ticao | 1—2 |
| ventricosa Lm. | M. ind. | 0,50-2 |
| ***Cassis.*** | | |
| abbreviata Lm. | Mazatlan | 1 |
| areola L. | Molucc. | 0,50-1,20 |
| coarctata Gray | Peru | 1—2 |
| cornuta L. | Oc. ind. | 1—3 |
| fimbriata Quoy | Aust. | 1—3 |
| flammea L. | Oc. ind. | 0,50-1,50 |
| glauca L. | Philippn. | 1—2 |
| var. coronulata Sow. | „ | 2 |
| japonica Rv. | Japan | 1-1,50 |
| Madagascariensis Lm. | Madg. | 2—4 |
| pila Rv. | China | 0,50-1 |
| rufa L. | Oc. ind. | 1 - 2 |
| sulcosa Brug. | M. med. | 0,40-1 |
| var. granulosa Küst. | „ | 0,50-60 |
| testiculus L. | Ind. occ. | 0,30-1 |
| torquata Rv. | N. Holl. | 1 |
| undata Mart. | Molucc. | 1—2 |
| vibex L. | Oc. ind. | 0,30-1 |
| var. erinacea L. | „ „ | 0,30-60 |
| ***Oniscia.*** | | |
| cancellata Sow. | China | 2 |
| oniscus L. | Ind. occ. | 0.40-1 |
| ***Dolium.*** | | |
| fasciatum Brug. | Ind. or. | 1-1,50 |
| galea L. | M. med. | 1—2 |
| olearium L. | Ind. or. | 0,80-1,50 |
| perdix L. | Maur. | 1—2 |

| | | Mk. |
|---|---|---|
| ***Malea.*** | | |
| dentata Born | Mexiko | 2—3 |
| pomum L. | Ind. or. | 0,30-1 |
| ***Ficula.*** | | |
| Dussimieri Val. | China | 1—3 |
| ficus L. | Oc. ind. | 1—2 |
| ficoides L. | „ | 1—3 |
| reticulata Lm. | Sooloo. Ins. | 1—3 |
| ***Scalaria.*** | | |
| Pallasii Kien. | Philippn. | 2 -3 |
| pretiosa Lm. | China | 6—18 |
| scaliola elata Semp. | Djedda | 0,20-30 |
| ***Terebra.*** | | |
| aciculata Lm. | Akapulco | 0,10-30 |
| affinis Gray | I. Tahiti | 0,20-40 |
| babylonia Lm. | „ | 0,50-60 |
| caerulescens Lm. | I. Viti | 0,30-40 |
| cerithina Lm. | I. Timor | 0,30-40 |
| chlorata | I. Seychell. | 0,60-80 |
| hastata Gm. | Ind. oc. | 0,30-40 |
| crenulata L. | Maur. | 0,80-1,50 |
| cingulifera Lm. | Philippn. | 0,80-1,50 |
| monilis Quoy | I. Marq. | 0,50-1 |
| duplicata L. | Zanzibar | 0,30-80 |
| var. Lamarki Kien. | Mad. | 0,30-50 |
| v. Dussimieri Kien. | Hain. | 0,40-1,20 |
| dimidiata | I. Tahiti | 0,40-1 |
| muscaria Lm. | I. Ticao | 0,40-1,50 |
| maculata Lm. | Ind. or. | 0,40-1,50 |
| Petiti Kien. | Sth. Carolina | 0,50-60 |
| simplex Carp. | Calif. | 0,20-30 |
| tigrina Gm. | Ind. oc. | 0,30-50 |
| ***Pyramidella.*** | | |
| auris-cati Ch. | Maur. | 0,30-50 |
| nitida A Ad. | Philippn. | 0,20-30 |
| propinqua A. Ad. | I. Societ. | 0,30-40 |
| ***Obeliscus.*** | | |
| dolabratus L. | Loanda | 0,30-50 |
| punctatus Chem. | Philipp. | 0,30-50 |
| tesselatus A. Ad. | Maur. | 0,20-40 |
| ***Eulima.*** | | |
| brevis Sow. | Hoods Ins. | 0,60-80 |
| cumingiana A. Ad. | W. Afrika | 1 |
| eburnea Mühlf. | Pt. au Prince | 0,40-50 |
| flexuosa A. Ad. | Mauritius | 0,40-60 |
| grandis A. Ad. | Philippn. | 1,20 |
| hastata Sow. | Mauritius | 0,80 |
| lactea A. Ad. | Philippn. | 0,60-80 |
| major Sow. | „ | 0,50-80 |
| pusilla „ | St. Elena | 0,40 |
| vitrea A. Ad. | Fidji Ins. | 0,50-60 |
| ***Stylifer.*** | | |
| acicula Gld. | I. Tahiti | 0,20-30 |
| deformis Pse. | „ | 0,50 |
| subulata Brod. | Mauritius | 1,20 |

## Conus.

| | | Mk. |
|---|---|---|
| achatinus Ch. | Philippn. | 1—2 |
| acuminatus Hwass | M. ind. | 0,80-2 |
| Adansoni Lm. | Sengl. | 1—2 |
| Amadis Ch. | Oc. ind. | 1—2 |
| ammiralis L. | Oc. ind. | 6—15 |
| anemone Lm. | Australien | 1—2 |
| arenatus Hwass | Philippn. | 0,30-1 |
| augur. Hwass | Ceylon | 2—3 |
| aulicus L. | Oc. ind. | 2—5 |
| aurantius Hwass | Molucc. | 4—12 |
| aurisiacus L. | Molucc. | 8—35 |
| australis Ch. | Australien | 2—3 |
| bandanus Hwass | Philippn. | 1—3 |
| betulinus L. | Ind. or. | 1—2 |
| baeticus Rve. | Philippn. | 2—3 |
| bullatus L. | Ind. or. | 3—5 |
| californicus Hinds | Californ. | 0,50-1 |
| canonicus Hwass | Or. ind. | 0,50-1 |
| capitaneus L. | Philippn. | 0,20-1 |
| catus Brug. | Tahiti | 0,40-1 |
| cedo-nulli Klein | Ind. occ. | 12—30 |
| characteristicus Ch. | „ | 3—4 |
| classiarius Hwass | Montijo B. | 1—3 |
| consors Sow. | N. Cald. | 1—2 |
| daucus Hwass | Ind. occ. | 1—2 |
| distans Hwass | Aust. | 1—3 |
| eburneus Hwass | Ceylon | 0,30-1 |
| Elisae Kien. | Madadascar | 4—5 |
| emaciatus Reeve | I. Viti | 1-1,50 |
| encaustus Kien. | I. Marq. | 1—2 |
| figulinus L. | Amboin | 0,40-1 |
| flavidus Lm. | Tahiti | 0,30-80 |
| fuscatus Born | Maur. | 1—2 |
| Gabrieli Kien. | Philippn. | 2—3 |
| generalis L. | M. ind. | 0,50-1,20 |
| gladiator Brod. | Panama | 0,50-1,20 |
| geographus L. | Australien | 0,50-2 |
| glans Hwass | ? Philippn. | 0,50-1,50 |
| gubernator, Hwass | Ceylon | 1—4 |
| Hebraeus L. | Oc. ind. | 0,20-80 |
| Janus Hwass | Maur. | 4—6 |
| imperialis L. | Philippinen | 1—3 |
| interruptus Brod. | Mazatlan | 2—3 |
| lineatus Ch. | Ceylon | 0,30-1 |
| lithoglyphus Meusch. | I. Ticao | 0,50-1,50 |
| litteratus L. | Or. ind. | 1—2 |
| lividus Hwass | Philippinen | 0,30-60 |
| magus L. | Or. ind. | 0,20-1 |
| var. carinatus Hwass | „ | 0,50-2 |
| mahogani Rv. | Salango | 2—3 |
| Malaccanus Hwass | Malacc. | 6—22 |
| Maldivus Hwass | Ceylon | 1-1,50 |
| marmoreus L. | Or. ind. | 0,30-1 |
| mercator L. | Sénégal | 0,50-2 |
| miles L. | Philipp. | 0,40-1,50 |
| miliaris Hwass | Annaa | 0,20-50 |
| millepunctatus L. | Maur. | 1—2 |
| minimus L. | Manil B. | 0,20-50 |
| monile Hwass | Ceylon | 0,50-1,50 |
| mustelinus Hwass | I. Bohol | 1—2 |
| Nemocanus Hwass | Oc. pacif. | 0,50-2,50 |
| Nicobaricus Hwass | Nicobar | 3—5 |
| nocturnus Hwass | Molucc. | 3—8 |
| v. Deburghiae Sow. | „ | 10 |
| Nov. Hollandiae. Ad. | N Holl. | 1 |
| nussatella L. | Philippinen | 0,40-2 |
| obesus Hw. | Oc. ind. | 1—2 |
| omaria Hwass | Ind. or. | 0,80-1,50 |
| Orbignyi And. | China | 40 |
| papilionaceus Hw. | Guinea | 1—4 |
| princeps L. | Amer. c. | 3—5 |
| pulicarius Hwass | Tahiti | 0,40-80 |
| puncticulatus Hwass | China | 0,30-50 |
| purpurascens Brod. | Panama | 1—3 |
| pygmaeus Rv. | S. Domingo | 0,20-40 |
| quercinus Hwass | Ceylon | 0,40-1,20 |
| regalitatis Sow. | Real. Lejl | 2—3 |
| senator L. | Guinea | 0,50-I |
| spectrum L. | Mauritius | 1,50-2,50 |
| sponsalis Ch. | L. Hood | 0,30-40 |
| stercus=muscarum L. | Ceyl. | 0,50-1,20 |
| striatus L. | Austr. | 0,40-1,20 |
| sulcatus Hwass | China | 0,80-2 |
| Sumatrensis Hwass | M. ind. | 2-2,50 |
| Suratensis „ | „ | 4—12 |
| tabidus Rv. | Afric. occ. | 2—5 |
| taeniatus Hwass | China | 0,50-1 |
| tahitensis „ | Tahiti | 0,80-1,50 |
| terebra Born | Philipp. | 0,50-2 |
| tesselatus Hwass | Oc. ind. | 0,40-1 |
| testudinarius Mart. | In. occ. | 1—3 |
| textile L. | Oc. asiat. | 0,50-2,50 |
| tulipa L. | Oc. ind. | 1—2 |
| varius L. | Philippinen | 1—2 |
| venulatus Hwass | Philippn. | 1—4 |
| v. ateralbus Kien. | Africa | 2—3 |
| verriculum Rv. | Ceylon | 0,50-2 |
| verrucosus Hw. | Mozambq. | 0,50-80 |
| vexillum Mart. | Philippinen | 1-3,50 |
| vicarius Lm. | Maurit. | 1—2 |
| virgo L. | Ceylon | 0,30-1 |
| viridulus Lm. | Oc. ind. | 1—2 |
| vitulinus Hwass | „ | 0,50-1 |
| zonatus „ | „ | 20 |

Bei **sofortiger** Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren.

Briefe einfach an die **„LINNÆA“, Naturhist. Institut**
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

---

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

No. 46.

# LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

## TAUSCH-CATALOG 1883 No. 5
der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

## *Binnen-Conchylien*
*aus dem paläarctischen Faunengebiet.*
(Fortsetzung).

### *a. Aus Kreta.*

Die nähere Angabe der Fundorte erfolgt bei Bestellungen auf den Etiquetten.

| | Mk. |
|---|---|
| Daudebardia Saulcyi Bourg. Thier in Alcohol | 2—4 |
| „ junge Schale . . . | 0,50 |
| Hyalinia Botterii Pfr. . . | 0,20-30 |
| „ hydatina Rossm. . | 0,20-30 |
| „ cydoniensis Blc. defect | 1-1,50 |
| „ protensa Fér. vera nicht frisch | 0,40-80 |
| Helix aspersa Müll. . . | 0,10-20 |
| „ aperta Born . . . | 0,20 |
| „ acuta Müll. . . . | 0,10 |
| „ amphiconus v. Maltz. | 0,60-80 |
| „ aegopinoides „ todt gs. | 2-3 |
| „ barbata Fér. . . . | 0,40-60 |
| „ bathytera Blanc. . . | 0,40-50 |
| „ Cretica Fér. . . . | 0,20-30 |
| „ „ var. alba . . | 0,30 |
| „ Diensis v. Maltz. . . | 0,40-50 |
| „ Freytagi „ . . | 0,60-1 |
| „ lecta Fér . . . . | 0,40-60 |
| „ mesostena Westerl. . | 0,30-40 |
| „ Naxia Fér. . . . . | 1-2,50 |
| „ v. Westerlundi Blanc. | 1—2 |
| „ noverca Friv. . . . | 0,40-1 |
| „ pellita Fér. . . . . | 0,20 |
| „ „ var. major . . | 0,40 |
| „ pisana L. . . . . | 0,10 |
| „ Psiloritana v. Maltz. | 0,40-50 |
| „ Rothi Pfr. . . . . | 0,20-30 |
| „ profuga A. Schm. . . | 0,10-20 |
| „ „ var. major. an. n. sp. | 0,30 |
| „ Syriaca Ehrenb. . . | 0,20-30 |
| „ suspecta Westerl. . . | 0,30-40 |
| „ subvariegata v. Maltz. | 0,30-40 |
| „ Sphakiota „ | 0,40-50 |
| „ Siderensis „ | 0,40-50 |
| „ turbinata Pfr. . . . | 0,10-20 |
| „ vermiculata Müll. . . | 0,10-20 |
| Buliminus Cretensis Pfr. . | 0,60-80 |
| „ var. elongata . . . | 0,80 |
| „ olivaceus Pfr. . . . | 0,30-40 |
| *Caecilianella* Maltzani Cless. | 0,30-40 |
| „ tumulorum Bourg. . | 0,30-40 |
| „ acicula Müll. *var.* . | 0,10-20 |
| Stenogyra decollata L. . | 0,10-20 |
| Pupa granum Drap. . . . | 0,10 |
| Clausilia amalthea Westerl. | 0,40 |
| „ „ var. similis Böttg. | 0,40 |
| „ Arthuriana Blanc . . | 1 |
| „ „ var major . . | 1,50 |
| „ bipalatalis v. Mart. . | 0,30 |

| | Mk. |
|---|---|
| Clausilia var. gracilior Bttg. | 0,40 |
| „ byzantina Charp. . . | 0,40 |
| „ „ var. intermedia A. Schm. | 0,40 |
| „ „ var. solidula Pfr. | 0,20 |
| „ „ f. minor . . . | 0,20 |
| „ Candida Pfr. . . . | 0,40 |
| „ „ var. major . . | 0,50 |
| „ clara Bttg. . . . . | 1—2 |
| „ „ v. pauciostata Btg. | 1—2 |
| „ corrugata Drap. typus | 0,50 |
| „ „ v. almyrosana Btg. | 0,40 |
| „ „ f. minor . . . | 0,30 |
| „ „ var. homaloraphe Bttg. | 0,40 |
| „ „ *subsp.* inflata Oliv. | 0,20 |
| „ „ „ var. gracilior Bttg. | 0,30 |
| „ „ „ f. minor . . | 0,20 |
| „ „ „ Draparnaldi Beck. | 0,50 |
| „ cretensis Rossm. . . | 1,20-1,50 |
| „ „ var. minor . . | 0,80-1 |
| „ extensa Pfr . . . . | 0,80-1,20 |
| „ „ var. centralis Bttg. | 1,20 |
| „ „ var. tenerrima „ | 1-1,50 |
| „ glabella Pfeiff. . . | 0,80 |
| „ „ var. pura Bttg. | 1 |
| „ Grabusana Bttg. . . | 1 |
| „ „ v. humillima Bttg. | 0,60-80 |
| „ Hippoliti Blanc . . | 1-1,20 |
| „ Maltzani Bttg. . . . | 1,50-2,50 |
| „ Moreletiana Blanc. . | 0,60 |
| „ „ var. minor . . | 0,50 |
| „ praeclara Pfr. . . . | 1—2 |
| „ „ var. major . . | 2,50 |
| „ striata Pfr. . . . . | 0,40 |
| „ „ var. major . . | 0,50 |
| „ strigata Pfr. typus . | 0,40 |
| „ „ v. occidentalis Btg. | 0,50 |
| „ „ var. occlusa Bttg. | 0,50 |
| „ „ var. centralis . | 0,50 |
| „ „ var. acuticosta . | 0,50 |
| „ sublamellosa Bttg. . | 1,20 |
| „ „ v. intermedia Btg. | 0,80 |
| „ „ var. oblitterata „ | 1,50 |
| „ subvirginea Bttg. var. farcimen Bttg. | 0,80 |
| „ tenuicostata Pfr. typus | 0,60 |
| „ „ v. strictecostata Btg. | 0,60 |
| „ „ var. omalica „ | 0,80 |
| „ „ var. sulcicollis „ | 0,60 |

| | Mk. |
|---|---|
| Clausilia tenuicostata var. mitis Bttg. | 0,60 |
| „ teres Oliv. typus . . | 0,60 |
| „ „ var. phalanga Bttg. | 0,80 |
| „ „ var. f. minor . . | 0,50 |
| „ „ var. subcostata Bttg | 0,60 |
| „ „ var. f. minor . . | 0,50 |
| „ „ v. hierapetrana Btg. | 0,40 |
| „ „ *subsp.* Vesti Bttg. | 0,80 |
| „ „ „ f. gigantea . | 1 |
| „ „ „ f. minor . . | 0,50 |
| „ „ „ v. orientalis Btg. | 0,60 |
| „ troglodytes A. Schm. var. vexans Bttg. | 0,50-60 |
| „ „ var. interpres „ | 0,50-60 |

| | Mk. |
|---|---|
| Clausilia torticollis Oliv. . | 1,50-3 |
| „ venosa Bttg. . . . | 1-1,20 |
| „ virginea Pfr. var leucoderma Bttg. | 0,60-80 |
| „ xanthostoma Bttg. . | 1 |
| „ „ var. minor . . | 0,80 |
| Planorbis spirorbis L. var. | 0,20 |
| „ glaber Jeffr. . . . | 0,10-20 |
| Hydrobia Maltzani Cless. . | 0,30-40 |
| Amnicola Cretica Cless. . | 0,20-30 |
| Melanopsis buccinoidea Oliv. | 0,20 |
| Neritina peloponesiaca Recl. | 0,20-30 |
| Carychium minimum Müll. var. inflata Bttg. | 0,20 |

### *b. Aus Griechenland und Kleinasien.*

| | |
|---|---|
| Hyalinia natolica alb. Brussa | 0,80-1 |
| Helix aberrans Mouss. „ | 0,30-40 |
| „ corcyrensis Fér. typus Graecia | 0,20-30 |
| „ „ var. canalifera „ | 0,30-40 |
| „ frequens Mouss. Brussa | 0,20-40 |
| „ lens Fér. Magnesia | 0,20 |
| „ Olivieri Fér. Graecia | 0,10-20 |
| „ „ var. parumcincta Bosporus | 0,10-20 |
| „ pyramidata Drap. Dardanellen | 0,10-20 |
| Buliminus Bergeri Roth Arkanania | 0,50-60 |
| „ carneolus Mouss. I. Prinkipos | 0,60-80 |
| „ detritus Müll. var. inflatus Parr. Brussa | 0,30 |
| „ Frivaldszkyi Pfr. „ | 0,60-80 |
| „ graecus Beck Morea | 0,40-50 |
| „ „ v. elongata Kob. | 0,50-80 |
| „ niso Risso todt ges. Dardanellen | 0,20 |
| „ Olympicus Parr. Brussa | 0,50-60 |
| „ orientalis Friv. I. Prinkipos | 1,20-1,50 |
| „ ovularis Oliv. Dardan. | 0,20-30 |
| „ pupa Brug. Graecia | 0,20 |
| „ Rossmaessleri Pfr. Brussa | 0,80-1 |
| „ Raynervalianus Bourg. Dardanellen. | 1-1,50 |
| „ squalinus Rossm. Brussa | 0,30 |
| „ Sturmi Küst. „ | 1-1,50 |
| „ Tournefortianus Fér. Brussa | 0,30-50 |

| | |
|---|---|
| Buliminus zebra Oliv. Athen | 0,10 |
| Pupa avenacea Drap. Brussa | 0,10 |
| „ cylindracea D. C. „ | 0,10 |
| „ doliolum Brug. var. scyphus Dardan. | 0,10-20 |
| Clausilia Agesilaos v. Mart. Taygetos | 0,30 |
| „ Arcadica Bttg. Arkad. | 0,50-60 |
| „ bicristata Friv. typus Parnass | 0,20 |
| „ bidens L. Scutari | 0,10-20 |
| „ circumdata Friv. Brussa | 0,30-40 |
| „ corpulenta „ „ | 0,20 |
| „ Goldfussi Bttg. Tayget. | 0,80-1 |
| „ Hetaera Friv. I. Prinkipos | 0,40-50 |
| „ munda Zgl. Smyrna | 0,30-40 |
| „ maritima Klec. v. Thiessea Bttg. Akarn. | 0,30-40 |
| „ maculosa Desh. Hym. | 0,30-40 |
| „ profuga Charp. Argos | 0,30-40 |
| „ Pikermiana Roth var. Kephissiae Marathon | 0,20 |
| „ saxicola Charp. Athen | 0,20 |
| „ spreta Fér. I. Prinkipos | 0,40-50 |
| „ semidenticulata Pfr. defect Dardan. | 0,60-80 |
| „ strumosa Friv. | 0,20 |
| „ Schwarzenbachi Friv. | 0,30-40 |
| „ Thiesseae Bttg. Graec. | 0,40-50 |
| „ venusta A. Sch. Parn. | 0,30-40 |
| „ Voithi Rossm. Tayget. | 0,30 |
| Cyclostoma elegans Drap. Brussa | 0,10-20 |
| Pomatias hellenicus Bourg. Graecia | 0,40 |

Bei **sofortiger** Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschvereins 10 % Rabatt.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. A. **Müller** zu adressiren.

Briefe einfach an die **„LINNÆA“, Naturhist. Institut**
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.

No. 47.

# LINNÆA, Naturhistorisches Institut Frankfurt a. M.

## *Tausch-Catalog 1883 No. 6.*
### *der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| ***Strombus*** | | |
| auris Dianae L. | Ind. or. | 0,40-1 |
| australis Sow. | Austral. | 2,00 |
| Campbelli Gray | „ | 1-1,20 |
| canarium L. | Ceylon | 0,30-60 |
| columba Gm. | Philppn. | 0,60-80 |
| cylindricus Sws. | I. d. fr. | 0,40-80 |
| dentatus L. | Ind. occ. | 0,80-1 |
| elegans Sow. | M. rubr. | 0,50-1 |
| epidromis L | Philppn. | 0,50-1 |
| fasciatus Born | Oc. ind. | 0,40-60 |
| floridus Lm. | „ | 0,20-50 |
| „ „ var. minor | „ | 0,20-30 |
| fusiformis Sow. | M. rubr. | 0,80-1 |
| gibberulus L. | Ind. or. | 0,20-60 |
| gigas L. c. op. | Ind. occ. | 4—5 |
| gracilior Wood | Californien | 1 – 2 |
| granulatus „ | Amer. c. | 1-1,50 |
| haemastomus L. | Mauritius. | 0,30-50 |
| inermis Sow. | Ind. occ. | 2—3 |
| Isabella Lm. | Philippn. | 0,40-60 |
| laciniatus Ch. | Amboina | 10,-- |
| lentiginosus L. | Philippn. | 0,40-80 |
| lobatus Sw. | Ind. occ. | 0,40-1,00 |
| luhuanus L. | Philippn. | 0,30-50 |
| maculatus Nutt. | I. Sandw. | 0,60-80 |
| marginatus L. | Ind. or. | 1,50 |
| melanostomus Sw. | Philippn. | 2—3 |
| minimus L. | „ | 0,20-40 |
| novae-zelandiae Ch. | N. Zeal. | 3 – 5 |
| papilio Ch. | N. Guin. | 5 - 7 |
| peruvianus Sw. | Peru | 3 – 5 |
| plicatus Lm. | Ind. or. | 0,20-40 |
| pugilis L. c. op. | Ind. occ. | 0,80-1,50 |
| pyrulatus Lm. | Florida | 1 — 2 |
| rugosus Sow. | Ind. or. | 1,50 |
| Ruppellii Rve. | M. rubr. | 0,40-80 |
| succinctus L. | Ceylon | 0,50-80 |
| septimus Ducl. | China | 2,— |
| terebellatus Sow. | Philippn. | 1-1,50 |
| tricornis Lm. | M. rubr. | 1,00-1,50 |
| urceus L. | Ind. or. | 0,20-40 |
| „ var. chrysostomus | „ | 0,30-50 |
| variabilis Sw. | Philippn. | 0,40-60 |
| vittatus L. | „ | 0,60 1,20 |
| ***Rostellaria*** | | |
| curvirostris Lm. | M. rubr. | 2—3 |
| crispata Sow. | Philippn. | 1—2 |
| ***Pterocera*** | | |
| aurantia Lm. | Ind. or. | 1-1,50 |
| chiragra L. | „ | 1-1,50 |
| elongata Sws. | Philippn. | 3—4 |
| lambis L. | Ind. or. | 0,50-1 |

| | | Mk. |
|---|---|---|
| multipes Desh. | M. ind. | 4—5 |
| scorpio L | Molucc. | 1—2 |
| ***Aporrhais*** | | |
| occidentalis Beck. | N. Fundl. | 5—8 |
| pes-carbonis Bronn | Mittelm. | 2 – 5 |
| pes-pelecani L. | Europ. | 0,20-80 |
| ***Struthiolaria*** | | |
| pes struthio cameli L. | N.Zeal. | 2,50-3,00 |
| ***Terebellum*** | | |
| subulatum Lm. | Oc. ind. | 0,50-1,20 |
| ***Priamus*** | | |
| stercus-pulicum Ch. | Cadix | ·20,— |
| ***Cypraea*** | | |
| albuginosa Maw. | Calforn. | 2—3 |
| angustata Gm. | N. Holl. | 1,50-3 |
| annulus L. | M. ind. | 0,10-30 |
| arabica L. | Ind. or. | 0,20-60 |
| arabicula Lm. | Columb. | 0,40-60 |
| arenosa Gray | I. Anna | 0,40-1 |
| argus L. | Oc. ind. | 1—2 |
| asellus L. | Ind. or. | 0,10-20 |
| aurantium Martyn. | Tahiti | 0,30 40 |
| caput serpentis L. | Ind. or. | 0,20-30 |
| carneola L. | Austr. | 0,20-60 |
| caurica L. | Oc. ind. | 0,10-40 |
| cervinetta Kien | Peru | 0,50-1 |
| cernica Sow. | Mauritius | 1—2 |
| cervus L. | M. anst. | 2 – 3 |
| cinerea Gm. | Ind. oc. | 1—2 |
| clandestina L. | M. asiat. | 0,10-20 |
| Comptoni Gray | N. Holl. | 2.— |
| cribaria L. | Oc. ind. | 0,40-80 |
| cribellum Gask. | Maurit. | 1-1,50 |
| cylindrica Barn. | Philippn. | 1—2 |
| eburnea Barn. | „ | 1—2 |
| edentula Sow. | Afric. mer. | 1-2,50 |
| erosa L. | Oc. ind. | 0,10-30 |
| errones L. | Ind. occ. | 0,10-30 |
| esontropia Ducl. | Austr. | 1—2 |
| exantherna L. | Ind. occ. | 0,60-1 |
| felina Gm. | Oc. ind. | 0,20-50 |
| fimbriata Gm. | Japan | 0,20-30 |
| gangrenosa Dillw. | China | 0,20-40 |
| helvola L. | Oc. ind. | 0,10-20 |
| hirundo L. | „ | 0,10-20 |
| interrupta Gray | Philippn. | 1-1,50 |
| irrorata Sol. | Pacif. | 0,50-60 |
| Isabella L. | Mdgscr. | 0,10-30 |
| Lamarki Gray | „ | 0,50-80 |
| lurida L. | Oc. atl. | 0,20-60 |
| lynx L. | Oc. ind. | 0,10-40 |
| mappa L. | „ | 1,50-3 |
| „ var. rosea | „ | 3—5 |

| | | Mk. |
|---|---|---|
| mauritiana L. | Oc. ind. | 0,50-1,20 |
| Menkeana Dsh. | Maurit. | 0,40-60 |
| microdon Gray | Philippn. | 0,40-50 |
| miliaris Gm. | Japan | 0,50-80 |
| moneta L. | Ind. or. | 0,10-20 |
| mus L. | Oc. atl. | 0,40-1 |
| neglecta Sow. | Ind. or. | 0,30-50 |
| nivosa „ (schön) | Siam. | 80,— |
| obvallata Lm. | Tahiti | 0,20-50 |
| ocellata L. | Ceylon | 0,20-30 |
| onyx L. | „ | 0.60-1,20 |
| „ var. adusta Lm. | „ | 0,80-1 |
| pallida Gray | Japan | 2,— |
| pantherina Soland. | M. ind. | 0,30-80 |
| picta Gray | Senegal | 1-1,50 |
| poraria L. | Austr. | 0,10-30 |
| pulchella Sw. (nicht schön) | China | 2—4 |
| punctulata Gray. | Panama | 0,30-50 |
| physis Brocchi | M. Med. | 10—20 |
| punctata L. | Philippn. | 0,40-60 |
| pyrum Gm. | M. med. | 0,50-1 |
| reticulata Martyn | Austr. | 0,40-1 |
| „ var. minor | „ | 0,20-30 |
| „ „ histrio | „ | 0,50 1 |
| Scottii Brod. | N. Holl. | 15—20 |
| scurra Ch. | Oc. ind. | 0,50-1,20 |
| Sowerbyi Ant. | Calif. | 1—2 |
| spurca L. | M. med. | 0,20-50 |
| stercoraria L. | Afric. | 0,50-1,50 |
| V. rattus „ | „ | 0,50-1,20 |
| stolida „ | Ceylon | 1—2 |
| subcylindrica Sow. | Austral. | 2,— |
| subviridis Rve. | „ | 1,50-2,50 |
| tabescens Soland. | Oc. ind. | 0,50-1,20 |
| talpa L. | M. ind | 0,30-1 |
| testudinaria L. | Oc. ind. | 2—3 |
| tigris L. | Ind. or. | 0,30-1 |
| turdus Lm. | M. ind. | 0,20-40 |
| umbilicata Sow. | Austr. | 8—12 |
| ursellus Gm. | Oc. ind. | 0,20-40 |
| undata L. | „ | 0,20-40 |
| variolaria Lm. | „ | 0,20-40 |
| ventriculus „ | Austral. | 0,80-1,50 |
| vitellus L. | Oc. ind. | 0,20-40 |
| ziczac L. | „ | 0,20-40 |

### *Trivia*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| Adansoni Gray | Mauritius | 3,— |
| annulata „ | I. Georg. | 0,80-2 |
| australis Lm. | N. Holl. | 0,40-50 |
| californica Gray. | Californ. | 0,20-40 |
| candida Gask. | Philippn. | 0,20-40 |
| Childreni Gray | Maurit. | 0,30-80 |
| cicercula L. | Pacif. | 0,20-40 |
| europaea Mft. | Europa | 0,10-30 |
| globulus L. | Ind. or. | 0,40-50 |
| insecta Migh. | I. Sandw. | 0,30-50 |
| margarita Soland | Austr. | 1-1,50 |
| nivea Gray | „ | 0,20-40 |
| nucleus L. | Maur. | 0,20-40 |
| oryza Lm. | M. ind. | 0,20-30 |
| ovulata „ | Cap. | 1—2 |
| pacifica Gray | Gallop. | 0,40-1 |
| pediculus L. | Ind. occ. | 0,20-30 |
| pulex Soland | M. med. | 0,10-30 |
| pustulata „ | Panama | 0,50-1 |
| quadripunctata Gr. | Ind. occ. | 0,20 |
| radians Lm. | Mexico | 0,30-60 |
| sanguinea Gray | Columb. | 0,20-40 |
| scabriuscula Gray | I. Ticao | 0,20-40 |
| staphylaea L. | Oc. ind. | 0,10-30 |
| V. limacina Lm. | Philippn. | 0,10-20 |
| subrostrata Gray. | Ind. occ. | 0,30-50 |
| suffusa „ | Gallop. | 0,20-30 |
| tricornis Jouss. | Maur. | 0,50-1 |
| vitrea Gask | Cap. | 0,50-1 |

### *Ovula*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| Adriatica Sow. | M. med. | 0,30-60 |
| carnea Poir. | „ | 0,20-30 |
| ovum L. | Oc. ind. | 0,30-1 |

### *Calpurnus*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| verrucosus L. | Philipp. | 0,40-80 |

### *Cyphoma*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| gibbosa L. | Oc. ind. | 0,20-30 |

### *Birostra*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| formicaria Sow. | Cochinch. | 0,40-60 |
| spelta L. | M. med. | 0,50-60 |

### *Pedicularia*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| pacifica Pease | Pacific. | 1-1,50 |

### *Cancellaria*

| | | Mk. |
|---|---|---|
| asperella Lam. | Philipp. | 3—5 |
| buccinoides Sow. | Callao. | 2-3,50 |
| cancellata L. | M. med. | 1—2 |
| costifera Sow. | Philipp. | 1—3 |
| littorinaeformis Sow. | Ceylon | 3—4 |
| lamellosa Hind. | Cap. | 2,50 |
| obliquata Lam. | Jansibas | 2-2,50 |
| piscatoria Desh. | Sénégal | 1,50-2,00 |
| rugosa Lam. | Ind. occ. | 1—2 |
| scalata Sow. | Maur. | 1-1,50 |
| scalarina Lam. | „ | 2—3 |
| spirata Lam. | Oc. ind. | 3—4 |
| semidisjuncta Sow. | Philipp. | 3—4 |
| similis Sow. | Sénégal | 1-2,50 |

Bei sofortiger Baarzahlung erhalten Mitglieder des Tauschver. 10% Rabatt.

Gelder und Postpackete bitten wir speciell an Dr. **A. Müller** zu adressiren

Briefe einfach an die „LINNÆA“, Naturhist. Institut
Frankfurt am Main, Elsheimerstrasse 7.

Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.